

# Doença Falciforme: Eventos Agudos e Sinais de Alerta

WWW.SAUDE.GOV.BR/BVS

## EVENTO AGUDO

## CONDUTA E EXAMES



### \*Analgésicos principais (sempre em intervalos fixos):

Medicamento	Posologia	Via	Administração em intervalos fixos
Dipirona	Adulto: 500 mg/dose Lactente: 10 mg/kg/dose Pré-escolar: 15-20 mg/kg/dose (máx. 1g/dia) Escolar: 25 mg/kg/dose (máx. 2g/dia)	Oral IM IV	4 - 6 horas
Paracetamol	Adulto: 500 - 1.000 mg/dose (máx. 4g/dia) Criança: 0,4 mg/kg/dose (máx. 4g/dia)	Oral	4 - 6 horas
Diclofenaco sódico	Adulto: 50 mg/dose 1-12 anos: 1 mg/kg/dose >12 anos: 50 mg/dose	Oral	8 - 12 horas
Codeína	Adulto: 10-20 mg/dose Criança: 1 mg/kg/dose	Oral Retal	4 - 6 horas
Morfina	Adulto: 10-30 mg/dose Criança: 0,1 mg/kg/dose	Oral IV SC	3 - 4 horas
Metadona	Adulto: 2,5 - 10 mg/dose Criança: 0,1 - 0,2 mg/kg/dose (máx. 10 mg/dose)	Oral IV IM	1ª - 2ª - 3ª 4 horas A seguir: 6 - 12 horas
Tramadol	Adulto: 100 mg/dose Criança (> 2 anos): 1 mg/kg/dose	Oral	6 - 6 horas

### \*\*Antibioticoterapia:

#### Esquema básico:

< 5 anos: Ampicilina: 100 - 200 mg/kg/dia IV de 6/6 horas  
> 5 anos: Penicilina G cristalina:  
Criança: 100.000 - 250.000 U/Kg/dia IV de 6/6 horas  
Adulto: dose máxima 24.000.000

#### Alternativa:

- Cefuroxime:  
Criança: 75 - 150 mg/kg/dia (máx. 1 g/dia)  
Adulto: 1 - 1½ g/dose (máx. 5 g/dia) IV de 8/8 horas
- Ceftriaxona:  
Criança: 50 - 75 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) IV de 12/12 horas  
Adulto: 1 - 2 g/dose (máx. 4 g/dia) IV de 12/12 horas

#### Observação:

Em casos suspeitos de infecção por *Mycoplasma pneumoniae*, associar eritromicina ou outro macrolídeo  
Eritromicina:  
Criança: 30 - 50 mg/kg/dia (máx. 2 g/dia), VO de 6/6 horas  
Adulto: 250 - 500 mg (máx. 4 g/dia), VO de 6/6 horas